

**DESMOSTACHYS LONGIPES H. PERR. SYNONYME
DE STEPHANODAPHNE CREMOSTACHYA BAILL.**

par H. PERRIER DE LA BATHIE

En révisant l'an dernier les Icacinacées de Madagascar, j'ai décrit sur un matériel insuffisant (un rameau avec quelques infrutescences) une espèce nouvelle de *Desmostachys*, le *D. longipes*, dont la description a paru dans les *Mémoires du Muséum*, t. XVIII (1944), p. 298. Or, quelque temps après la parution de cette description, M. le P^r H. HUMBERT a eu l'extrême obligeance de me signaler que ce prétendu *Desmostachys* n'était autre qu'une Thyméléacée, le *Stephanodaphne cremostachya* Baill., que l'absence de fleur et des feuilles fort semblables à celles des *Desmostachys* m'avaient fait méconnaître. Le nom *Desmostachys longipes* H. Perr. doit donc disparaître, et le genre n'est représenté à Madagascar que par *D. Planchonianus*, qui se rencontre également aux Comores et en Afrique australe.

En ce qui concerne le *Stephanodaphne cremostachya* Baill., je crois utile de donner ici, d'après *Humbert* 5.960, la description du fruit, qui n'était pas connu.

Fructus drupaceus sessilis, subrhomboidalis oblongusve, plus minus pilosus, 1-locularis, monospermus, exocarpio membranaceo, carne pauca, endocarpio duro incrassato. Semen pendulum, testo papyraceo, albumine carnosissimo; embryonis axillis majusculi cotyledonibus foliaceis latis; radícula brevi.

AILANTOPSIS GAGNEP. = HEYNEA ROXB.

par F. GAGNEPAIN

Lorsque je décrivis ce genre *Ailantopsis*, je ne disposais que de fleurs trop jeunes dans lesquelles les sépales paraissaient libres, les anthères sessiles et libres, la croissance inter-

calaire n'étant pas encore intervenue, en particulier pour allonger et souder les filets staminaux.

Depuis j'ai trouvé, dans des échantillons identiques à ceux sur lesquels j'ai fondé *Ailantopsis*, des fleurs adultes qui ne me laissent plus aucun doute : *Ailantopsis* = *Heynea trijuga* ! Depuis quelque temps, suspectant la validité de mon genre, j'avais demandé à F. Pellegrin si ce genre ne concordait pas avec quelque genre des Méliacées bien connues de lui.

Il l'avait rapproché de *Heynea trijuga*, var. *velutina*. Après examen des fleurs adultes, je suis de son avis. Cela fait deux certitudes au lieu d'une.

SAPINDACÉES NOUVELLES OU LITIGIEUSES

par F. GAGNEPAIN

Otophora capillipes Gagnep., spec. nov.

Arbuscula 1.20 m. alta. Ramuli validi, 8 mm. crassi, pilis longis flexuosis hirsuti. Folia 50 cm. circiter longa, foliolis 6-jugis, ovatis, vel oblongo-acuminatis, basi rotundis, vel emarginatis, apice longe et acute acuminatis, infinis 7 cm. \times 3.5, mediis 20-25 \times 6 cm. metientibus, tenuibus, subconcoloribus, infra ad nervos pilosis ; nervi secundarii 9-14 utrinque, ad marginem arcuatim confluentes ; venulae laxae reticulatae, utrinque haud bene conspicuae ; petioluli breves, subnulli, pilis fulvis longis cum costa hirsutissimi ; petiolus 35 cm. longus, late alatus, ad medium inter foliola 10-12 mm. metiens ; pseudostipulae cordiformes, 10-15 mm. longae lataeque, apice obtusissimae. Inflorescentia fructigera axillaris, lateralis, purpurea, glabra, 10 cm. longa, ramulis gracilibus ; pedicellis 12-15 mm. longis, capillaribus. Fructus juvenis ellipticus, laete roseus, valde compressus, laevis, 15 mm. longus, 8 latus, coccis subinconspicuis, semine ignoto.

ANNAM : limite S. de la prov. Quang-nam, *Poilane* 31.825.

Diffère de *O. Poilanei* Gagnep., qui est affine : 1° par les folioles oblongues, nettement acuminées ; 2° par le pédicelle fauctifère filiforme égalant le fruit ou plus long ; 3° par le fruit plus comprimé à âge égal.

Otophora Eberhardtii Gagnep., spec. nov. ; *O. cambodiana* var. H. Lec. in herb.